

Prescriptiecijfers voor een FTO over palliatieve pijnbestrijding

SFK Select

Wilt u als apotheker gebruik maken van de FTO-rapportage 'Pijnbestrijding in de palliatieve fase' in SFK Select, dan moet u deelnemer van de SFK zijn. Voor meer informatie zie www.sfk.nl.

Vraag 1-3

- Ga op www.sfk.nl naar SFK Select en log in.
- Selecteer de optie FTO-modules (IVM), gevolgd door 'Pijnbestrijding in de palliatieve fase'.
- Selecteer de huisartsen van uw FTO en de gewenste rapportageperiode en voer het document uit.
- Kies uw apotheek of cluster. U krijgt dan de benodigde aantallen patiënten of voorschriften per huisarts.
- Stuur de informatie op naar de voorbereiders van het FTO.

Vraag 1: Hoeveel gebruikers van sterkwerkende opioïden gebruiken tevens een laxans?

- Selecteer alle patiënten met een sterkwerkend opioïd in het afgelopen jaar.
- Bepaal het aantal gebruikers van een sterkwerkend opioïd met en zonder laxans (zie hieronder voor de definitie en relevante ATC-codes).

Vraag 2: Welke laxantia gebruiken gebruikers van sterkwerkende opioïden?

- Selecteer alle patiënten met een sterkwerkend opioïd en een laxans in het afgelopen jaar.
- Bepaal het aantal opioïdgebruikers met emolliëntia, met contactlaxantia, met volumevergrotende laxantia en met overige laxantia (zie hieronder voor de relevante ATC-codes)

Vraag 3 Welke toedieningsvorm schrijft de huisarts voor bij sterkwerkende opioïden?

- Selecteer alle voorschriften voor sterkwerkende opioïden in het afgelopen jaar.
- Bepaal het aantal voorschriften per toedieningsvorm. Maak onderscheid tussen oraal zonder gereguleerde afgifte, oraal met gereguleerde afgifte, oromucosaal, transdermaal, rectaal, parenteraal en intranasaal (Zie hieronder voor de relevante codes van de farmaceutische vormen).

Relevante ATC-codes en codes farmaceutische vormen

ATC-code	Geneesmiddel
<i>Opioiden</i>	
N02AA + AB + AC (excl. N02AA55 N02AA59 N02AA79)	Sterkwerkende opioïden
<i>Laxantia</i>	
A06A	Laxantia
A06AA	Emolliëntia
A06AB	Contactlaxantia
A06AC	Volumevergrotenende laxantia
A06AD	Osmotisch werkende laxantia
A06AG	Klysma's
A06AH	Perifere opioïdreceptorantagonisten
A06AX	Overige laxantia
Code farmaceutische vorm	Toedieningsvorm sterkwerkende opioïden
4 + 16 + 200 + 230 + 300 + 379 + 400	Oraal (zonder gereguleerde afgifte) (ex. MGA)
310 + 350	Oraal met gereguleerde afgifte (MGA)
75 + 80 + 330 + 331	Oromucosaal/sublinguaal
752	Transdermaal
100	Rectaal
79 + 83 + 540 + 541 + 550	Parenteraal
521	Intranasaal

Opioïd gebruikers met laxans

Gebruiker

Met een gebruikperiode van tenminste 3 dagen in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 3 maanden

Gecorrigeerde gebruikperiode

De gebruikperiodes van de opioïden corrigeren voor overlappende afleveringen

Standaard gebruikperiode

Indien bij 'opioïden' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 14 dagen als gebruikperiode aan.

Indien bij 'laxantia' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 30 dagen als gebruikperiode aan

Gelijktijdig gebruik

Overlappende gebruikperiodes van 'opioïd' en 'laxans' voor tenminste 3 dagen in de rapportageperiode onafgebroken

Passant

Standaard uitgesloten van deze selecties zijn passanten. Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen

Selectie (B/A)

A: Patiënten met 'gebruik' van 'opioïden'

B: Patiënten uit 'A' die 'gelijktijdig gebruik' hadden van een 'laxantia'